CONSIGNE DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT L'ETIQUETTE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

En manipulant, en préparant et en utilisant le produit :

- Ne pas manger, ne pas boire ou fumer pendant l'application.
- Ne pas respirer le produit ou le nuage de pulvérisation.
- Porter des vêtements de protection.

Après emploi :

- Bien rincer le matériel de pulvérisation
- Se laver à l'eau et au savon et changer de vêtements.

Destruction des emballages vides :

Percer, brûler ou enfouir afin d'éviter leur réutilisation.

Stockage:

- Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux
- Conserver uniquement dans l'emballage d'origine, bien fermé et étiqueté,
- Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec beaucoup d'eau, ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation, déplacer la victime à l'air frais, la laisser au calme, au chaud et aider à respirer si nécessaire. Contacter un médecin.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau propre pendant au moins15 minutes, en prenant soin de tenir les yeux ouverts.

En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements contaminés et laver les parties touchées avec beaucoup d'eau et du savon.

Dans tous les cas, contacter un médecin dès que possible, lui montrer l'étiquette.

Note au médecin: pas d'antidote spécifique; traiter selon les symptômes.

HERBICIDE



Propaquizafop 100 g/l

Herbicide Selectif De Post-levee Contre Les Graminees Annuelles Et Vivaces



Culture: Tomato, Onions & Groundnuts.









1L

Fabriqué par:

Adama Agan Ltd.

P.O.Box 262, Northern Industrial Zone 77102 Ashdod, Israel Distribué par:
Adama West Africa Burkina Faso Ltd
01 BP 1495 Bobo Dioulasso 01,
Burkina Faso

Tel/Fax: 00226 20976848

Batch No.	Date of Manuf:	Expiry date:
EPA Registrat	ion N°:	











MODE D'EMPLOI

AGIL 100 EC est un herbicide de post-levée, sélectif et systémique pour le contrôle des mauvaises herbes dans de nombreuses cultures.

AGIL 100 EC est efficace sur un large spectre de graminées adventices annuelles et vivaces.

Préparation de la bouillie:

Remplir le réservoir du pulvérisateur à dos à moitié d'eau.

- Ajouter la quantité d'AGIL 100 EC recommandée.
- Remuer et traiter.

Volume de bouillie: 60 à 250 litres d'eau/ha selon le type d'appareil et la buse utilisée.

PRATIQUES CULTURALES		
Cultures	Doses d'application	
Cultures maraîchères : Ail, Carotte, Choux, Epinard, Laitue, Melon, Oignons, Persil, Poivrons, Tomate		
Arachides, Haricots, Niébé, Soja	0,8 L à 1 L/ha	
Cultures fruitières : Ananas, Agrumes		
Pomme de terre, Manioc, Igname		
Coton		

Appliquer **AGIL 100 EC** après la levée des graminées; lorsque les adventices sont en pleine croissance.

COMPATIBILITES

AGIL 100 EC est compatible avec les fongicides, les insecticides et les herbicides. Cependant, un test préalable de compatibilité physique est conseillé.

DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Sans objet

INDICATION DES RESPONSABILITES LEGALES

Notre responsabilité est limitée à la fourniture de spécialités recommandées par la recherche, autorisées la vente et conforme à la formule indiquée sur l'emballage.

Etant donné que le stockage, le transport et l'emploi ne sont pas sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité, directe ou indirecte, pour les conséquences, les dégâts ou les accidents pouvant en résulter.